共七

日用門 下

醫藥門

攷事新書

七

癸亥春十番続十四

攷事新書卷之十四

日用門 下

收筆法

收筆東坡以黃連蒿苣煎湯調輕粉蘸筆頭候乾收之不蛀◎山谷以蜀椒黃蘗煎湯磨松煤染筆藏之不蛀◎養筆以硫黃酒舒其毫◎洗筆法以皂盛熱湯浸一炊久輕輕擺洗次都用冷水滌之如有油膩則以皂角洗之甚佳

造墨法

李廷珪造墨法淸麻油十斤內先取三斤以蘇木一

一两半黄連二两半杏仁二两搥碎同煎候油變色
放温濾去滓傾入餘油中攪匀掘地安盞深淺令
與盞平滿添油注燈以瓦盆約面濶八九寸底深
三寸許者覆之仍用方寸瓦厇擡起三面不可太
高又不可太低毎一炷久即掃一度只可作十盞
盞多則掃不徹毎煙四两半用黄連半两蘓木四
两各搥碎水二盞同煎五六沸候色變用熱絹濾
去滓别用沉香一錢半煎留水四两許再濾次用
腦半錢麝一錢輕粉一錢半以藥汁半合研化先
將藥汁入乾膠一两一錢五分同熬不住手攪令

溶後入腦麝汁攪匀來熱傾入煙内瓢無風處速攪和次瓢案上團揉候光可照人方印作鋌子頓無風處窨五六日候乾取出淨刷收貯〇造膠法黃牛皮水浸透掠去毛仰攤在平板上取生黃土匀撒皮上良久以小刀刻去筋膜換水頻洗斫碎入無油膩鍋内水煎成膠傾出薄攤竹滈子上風乾

韋仲將合墨法以好純煙擣訖以細絹篩於缸中煙一斤先以好膠五兩浸梣皮梣江南樊鷄木也其皮入水緑色汁中可下雞子白去黃五枚亦以眞朱紅一兩射香

一両皆別治細篩都合調下鐵臼中寧剛不宜澤
擣三萬杵多〻益善合墨不得過二月九月温時
敗臭寒則難乾潼溶見風日破碎仲將之墨一點
如漆

今俗造墨法純煙十斤阿膠四斤水十斤以水九斤
浸膠盛銅盆置火上待融以煙和訖以餘一斤水
洗盆盛別器擣時用水揮洒擣期萬杵又以不染
掌為度作丁時從薄印出於幽室中平板上布濕
灰一寸許令平次布紙上攤墨〻上布紙再布濕
灰一寸許經三夜或一夜後毎丁割四方令正又

布乾灰一寸許於板上如前布紙於墨上下又布乾灰一寸許經三夜或一夜出攤於幽室中平板上數日翻覆以堅為度

造松煤墨法多取松煙入鍋煮膠待乾製造阿膠及水斤兩如上造法作丁時大小厚薄隨宜但必以萬杵為度無異真墨

藏墨法用熟艾和收過梅月藏石灰中不蒸○養墨以豹皮囊貯於遠濕也○肥皂浸水磨墨可於油紙上寫字

搥紙法

乾紙十張外洒湿一張沓上如此重疊沓起以百張為一垛放平正案上又以平面板壓在上以大石壓之經一伏時上下乾湿皆匀提二三百下皆着實於百張内將五十張晒乾却與湿者五十張乾湿相間皆了再匀提二三百下依上納晒乾一半又乾湿相間皆了如此三四次直至無一張沾粘為度再以石碾三四次倒下提匀直至光滑如油紙○養紙以芙蓉粉借其色也○白香山常用葵箋綠色而澤入墨覺有精彩其法採帶露蜀葵葉研汁用布揩抹紙上候少乾用石壓之

洗硯法

凡硯須日滌之過二三日墨色差減縱未能滌亦須易水春夏蒸湿之時墨久留其門則膠力滞而不可用尤要頻々滌去○洗硯不得使熱湯亦不得用氈片故紙常接皂角水洗之為得○洗硯用蓮殼（蓮房或枯炭）或半夏切平擦之大去滞墨

竹硯滴法

銅性猛烈貯水久則有毒多脆筆毫者磁本好而莫若竹取節長二寸許以小竹插作觜甚是標格清致誠野人之物也

書畫諸法

書絹帛法用生薑ᄌ磨墨則不陰用絹擦絹上則寫字易工

藏書畫法凡書畫當於梅雨前晒令極燥書則頓廚櫃畫則捲入匣子以紙糊積匣小縫令不通風過梅月方開則不蒸蓋蒸風自外而入故也古人藏書多用芸香辟蠹麝香亦可一法用樟腦亦佳

洗書畫法將書畫鋪平案上取水勻噴濕複令四面平穩用馬尾刷于羅裹水石末如一錢原再噴濕又用羅皂莢灰如前便半時辰以溫水衝起如有污損

取燈草揩即淨潔如是墨污須用一伏時方以溫水銜之墨跡即去○書畫蒸濕變浥者用冬瓜或銀杏搽洗之○墨污書籍用燈草蘸水洗即去

褙書糊法先以盆貯水緩傾好麵於水上任其自沉不可攪攪則有塊置盆淨室中夏七八日冬半月候極臭敗徐徐去水別用新水及胡椒煎水調攪令勻煮極熟稍硬取出作大團入石灰湯浸之臨用取出量稀稠添熱湯爛研以布絞濾每一椀入白礬末半兩黃蠟二錢半和勻用之不用礬則有蟲蛀蠹傷之患凡褙碑文及綾帛須用硬糊即不失

光若潤透則失光矣○麪一斤浸水夏五日冬十日待臭淹出白芨五錢白礬三分水煎去滓和麪打成濃糊入桐油黄蠟芸香各三錢重就鍋内打作一團别换水煮令熟去水傾置瓷内日换水浸臨用以湯調開

造燈燭法

製造書燈法以薄木板作之如木櫃狀墨漆寛五六寸只可容一燈盞高八寸頂有圓竅徑三寸前有吊窓掛起則燈光直射於書上其明倍於常燈○香油一斤入桐油三兩耐點又辟鼠耗以鹽少許

置盞中亦可省油以生薑擦盞邉不生暈○以蘸木煎燈心曬乾炷燈則無燼○立春前一日或臘前一日以水浸燈心小時晒乾収之夏月點燈則蚊蚋不近○桃燈杖二月初二日或清明日五更一日未出時云不語採薺菜梗陰乾作桃燈杖諸虫永不入燈盞内

耐點蠟燭法黃蠟松脂槐花各一斤滑石水泡石也四兩同一處溶用燈心布澆一晝夜僅點一寸○風前燈乾漆擣海金沙硝石流黃各一兩黑豆末瀝青黃蠟各一兩先溶瀝青黃蠟成汁後入前件滚和

以舊布火上攤作條燃風前不滅（一云用蠟蔡稭風雨中亦不滅）
○萬里燭黃花地丁皮皂角花松花槐花各二錢
蜜一斤同煎數沸濾出入白芨二錢候弄暈時退
火已凝結矣

引光奴制松明為小片薄如紙鎔硫黃塗其鋭夜有
急用是發火即燃或用樺皮燒太急易滅不如松
明之耐久也

雷宿火法

炭十斤鐵屎十斤合擣成末生芙蓉葉三斤再擣入
糯米膠和捏作馱炭晒乾燒紅三日不滅○好胡

桃一箇燒半燼灰埋三百日不燼○造香炭以石
灰無則木灰亦可同生葵葉搗和為餅晒乾焚香雖冷濕
地火亦不滅

造爐香法

爐香山居不可缺取去松栢根葉枝實搗治之研楓
肪和之每焚一丸亦足取清苦

造枕法褥

石枕無如磁石如無大塊以碎者琢成枕面下以木
鑲最能明眼明眼者無如此可老而不昏○菊花
枕秋採甘菊花貯以紅布囊作枕用能清頭目去

邪穢

神枕五月五日七月七日取山林柏以為枕長一尺二寸高四寸空中容一斗二升以柏心赤者為盖厚二分蹟盖上為三行〻四十孔凡一百二十孔令容粟米大用藥芎藭當歸白芷辛夷杜蘅白朮古本本蘭川椒桂皮乾干防風仁蓼吉更白伏令荆宲肉蓯蓉飛廉柏宲薏苡欵冬花白薇秦椒蘼蕪凡二十四物以應二十四氣加毒者八物以應八風烏頭附子藜蘆皂莢岗草礬石半夏細辛凡三十三物各一兩皆剉以毒藥上安之滿枕中用

布囊以衣袍復以帯囊重包之臨臥時脫去之盖防藥氣外泄也袍之百日面有光澤一年體中諸疾皆愈而滿身盡香四年白髮還黑落齒復生耳目聰明神方驗秘不傳其非人也○

蒲花褥採蒲花如柳絮者熟鞭（一云揉蒲略蒸晒燥取花）貯以方青囊作坐褥或臥褥甚温煖木綿不及也

拄杖法

拄杖法以班竹為上竹欲老瘦而堅硬班欲微赤而點踈○點班竹法硇砂五戔班猫一戔石炭一戔用醋調點竹上火熁之成色

掛琴法

琴不宜着壁有土氣惟板壁上為妙

磨劒法

磨劒不得用水及麁石當以香油就膩石慢〻磨去銹却用打鐵爐邊打落鐵蛾兒三両入木炭一両水銀一両同為末㭙劒上以布片蘸油耐久磨擦其光如鏡綿子拭淨以酥塗掛起永不銹〇菘菜子作油塗之鼲鼠皮毛頻拭鐵物則良〇以木賊擦之銹自落

輭玉石法

蠐螬肪塗玉則刻之如蠟但可多得取肥者煎膏以塗玉亦軟滑易截古玉器有奇特雕琢非人工者多是昆吾刀及蠐螬肪所刻也○地榆根燒灰能爛石蠐螬灰取以塗石亦能爛

粘尾石法

榆白皮濕擣如糊用粘尾石極有力○白膠香真者一兩黃蠟瀝青各一戔香油一滴尋所壞石同色者擣為末和作膏烘熱粘之此可補石神膠也如粘山石斷者則去石末加蛤粉調乾粘之○鷄子白和白礬末粘磁器甚好

奴婢不逃自還法

張華物類相感志曰以龍帶麻作線左繋之縫奴婢衣脊一尺六寸即無逃走之心○張華志曰取逃人衣裳井中垂運之則逃人自還本草曰取逃人髮於緯車上却轉之則迷亂不知所適云今俗以紙書逃人姓名貼梁上亦此類也

辟寒法

取天門冬白伏苓等分為末酒服二叒日再則大寒時單衣汗出○清一匙吞下最能禦寒

辟墓中罔象蝸法

灸轂子曰罔象好食亡人肝腦而畏虎與柏故墓上樹柏墓前立虎又小說曰地中有物名蝹食死人腦以柏穿其首則死故墓前樹柏云

夜行辟鬼火法

說郛曰入田野中見鬼火以鞍兩鐙相叩作拼鬼火即滅

入山辟妖魅法

入山則山精老魅或作人形當懸明鏡九寸於背後其形在鏡中則不能變消亡退步

入山辟虎狼法

入山林誦儀康不怕虎狼○夜行勿歌唱大呼虎狼
夜聽人唱聲追害之
避亂止兒哭法
用綿作一小毬略使滿口而不致閉其氣以甘草煎
湯或甜物漬之臨時縛置兒口中使嚥其味兒口
有物塞之自不能作聲而綿軟不傷兒口蓋不幸
而遇禍難啼聲不止恐為賊所聞棄之道傍哀哉
用此法活人甚衆不可不知
避亂辟煙熏法
有人避亂石窟賊以煙火熏之迷悶欲死得蘿蔔嚼

汁下咽而甦蘿蔔子水研取服亦解

避亂救飢法

辟亂大道丸黒豆一升去皮貫衆甘草各一两茯苓蒼朮砂仁各五錢剉碎用水五盞同豆慢火熬煎直至水盡揀去藥取豆搗如泥作芡實大磁罐密封每嚼一丸則忍食苗葉終日可飽雖異草殊木素所不識并無毒甘甜與進飯同○又一方黒豆一升貫衆一斤同煮○嚥津服水法飢餓欲死便閉口以舌攪上下齒取津液嚥之一日得三百六十嚥便佳漸習乃可至千自然不飢三五日疲極

過此便漸强若有水庸卒無恙便以左手掬水呪曰丞掾吏之賜真乏粮正赤黃行無過城下諸醫以自防呪畢三叩齒右手指三叩左手如此三遍便歠之有極恙貯水尤佳如法日服二升便不飢

○服六天氣法春食朝霞日欲出時向東氣也夏食正陽南方日中氣也秋食飛泉日欲沒時向西氣也冬食沆瀣北方夜半氣也并天玄地黃之氣是為六氣皆令人不飢延年無疾一云平明為朝霞日中為正陽日入為飛泉夜半為沆瀣并天玄地黃為六氣昔有人墮穴中其中有蛇每日作此

二氣服之其人依蛇時節飢時便服日〻如之久漸有驗似能輕氣啓蟄之後人與蛇一時躍出

辟蟲法

辟蛇法養鵝能辟蛇○燒羖羊角蛇即遠去○四壁柱上用倒流水研墨書龍字貼之○多用小尾磚尾寫儀方二字置四處蛇見自畏退○端午日午時用朱砂寫茶字貼之蛇蝎不敢近○清明日取戌方土煎狗尾作泥塞戶內孔穴則蛇鼠諸虫永不敢入凡凡行山路帶雄黃在身或研水塗脚心蛇自遠避不敢近○凡入山林默念儀方不見蛇

虫

鷰巢引蛇書戌字貼於燕至處則不来○用白紙朱書鳳凰二字貼巢上即去

辟鼠法用木刻猫児一箇以赤鼠尿調彩畫之鼠見自走○用黑犬血和蟹燒之諸鼠悉去○大雄鼠一箇割去其勢放之滿屋自咬鼠死似猫○荷葉梗塞鼠穴鼠自去○每月辰日（四要日正 月辰日）塞鼠穴則自無鼠○遇寅日以物塞鼠穴鼠自斷○逐月庚寅日壬辰日并滿日及正月上辰日塞鼠穴○三月庚午日斬鼠尾取血塗梁可永辟○牛蒡子

殼似草麻蔎有刺尖有倒鈎鼠甚畏之著其體粘住即死故一名鼠粘子置於鼠穴可逐鼠

一辟蚊虫法書風字間字於窓間壁下無則国用浮萍羌活為末焚之蚊虫自死○用鱉殼夜明砂為末燒之○夜明砂燒煙可辟蚊子○除夜五更使一人壺中向壺扇一人問云扇甚的答云扇蚊子則無蚊子○端午日五更依前法扇問答无驗○端午日取大蝦蟆一箇用好墨一塊入打口中紅綠縛住取正午時方掘一次(穴)深五更(尺)埋之至第二日午時取蝦蟆口中墨打壁上畫(葫)蘆一箇用淨水噴

三日蚊子盡入葫蘆內不可打殺欲其去時用扇
々去取墨蝦蟆活則驗○端午日用麻線一條圍
床周匝以蝙蝠血塗遍繫床四面絶蚊蚋○端午
日取浮萍陰乾燒煙蚊子自去（一云去蚤蟲及蟣蚊虱）○鰻
鱺魚（蛇魚）長乾者燒室中蚊化為水○端午日用臘
水洗屋下無蚊蠅 用土閑日泥壁用水閑日掛
帳則無蚊蠅

辟蚕虱法用菖蒲蒽浮萍名一斤為末每用半盞許
撒於席上次日皆自死（泊狗蚕因）○乾菖蒲細切寘席
下又以射香少許著在薦上皆可去之○用臘雪

水日洒薦席能去蚤虱○凡人洗濯衣服於粉糨
内入水銀小許研匀糨衣其後虱永不生○帚砒
礵辟蚤虱○辟狗蚤法用菖蒲末糁席上極驗
用伏令末糁茵席下 用好木瓜苑鋪床下 清
明日用熨斗内着火炒棗子於床下帳内上下令
煙出令一人問炒甚的荅云炒狗蚤七問七荅則
狗蚤不生○端午日用熨斗燒一棗置床下辟狗
蚤以上諸法并辟壁虱○三月三日收薺菜花鋪床席下去
蚤 辟壁虱法用紙書欠我青州木瓜錢七字貼
於床脚上忽然不見一 云張三賢買丁木瓜不還

錢一去三十年寫此貼床脚上亦驗○用白男蹄 馬
於床下焚燒壁虱為盡化血○用蔚香殼三箇為
末置席下即去○用辣蓼晒乾鋪席下即去○萍
燒煙熏之即去又辟蜈蚣○辟蟣虱法用菖蒲神
麵白礬各半兩硝石一分黑錫一兩銚內鎔錫入
礬硝研成粉入菖蒲麵末以水同煮綿帶子不拘
多少一炊久候乾每條以水服一錢於手內唾調
如泥搓搭帶上用繫腰及頭衣服上永無蟣虱○
人多虱者將及冬用水銀二三錢臈茶末一錢於
掌內以津唾調開將綿作繩捘句在上以絹作帶

裹之繫於腰間用百部秦艽各一兩各擣為末燒煙放衣熏籠上熏之虱自盡落若用二味煮湯洗衣尤妙○辟頭虱法用藜蘆為末摻髮中經宿虱皆自落藜蘆百部同擣為末摻髮內搓搽○用輕粉少許摻頭上一二日虱皆盡死

辟蠅法端午日午時寫白字倒貼於柱上四處則無蠅○用臘雪水洒几桌上蠅自去○臘日月瓶器○盛猪肪脂四五兩緊封瓶口當上房中廚內各懸一瓶當夏雖有蠅十去八九○臘月八日懸猪脂於厠上一家無蠅○元日平朝用鹽豉吞七粒終

歲不於食中誤喫蠅子

辟廚間諸蟲法三月初二日鷄鳴時以隔宿冷炊湯澆洒瓶口及飯甑及一應廚物永無百虫游走為害〇三月三日收薺菜花鋪竈上去蟲蟻〇辟井竈洒蟲清明前二日夜鷄鳴炊黍米熟取釜中湯遍洒井中竈邊地則無馬蝗百蟲不近井竈甚驗〇烏賊骨投井中蟲盡死

辟諸物被蛀法用莽草燒煙熏之則蛀虫皆盡〇七月收角蒿置氊褥書籍中辟蛀蟲〇。鱺鰻魚燒熏氈中斷蛀蟲置骨箱中斷魚白免諸虫咬衣服燒

熏竹木辟蛀虫○芸薹置書中無蠹患○竹罷生蛀用生桐油點蛀處則止○辟衣帛虫蛀法端午日取萵苣葉置於廚櫃中則蛀虫不生○辟皮物虫蛀法七月七日晒曝草麥無虫○以艾葉捲打皮內放在甕中泥封甕口或用花椒在内捲収之亦可○毛衣用無油漆板匣収貯紙糊板縫不通風則不蛀

附雜忌

酉陽雜俎曰形不欲照水照井及浴盆中所謂行不履影亦此意歟又曰俗諱五月上屋言五月人蛻

上屋見影魂當去○山居四要曰凡卧歌詠大不祥世言夜卧喜歌者多夭蓋以此也○漢和帝時初伏令閉晝日註伏日萬鬼行故晝日閉門不干他事程曉伏日詩平生三伏時道路無行車○說郛曰賣宅之財買奴婢及生物并不利於人賣驢馬之財不聽婦令家耗不安○每月初六十六二十六日勿登厠〻神守厠日也

故事新書卷之十五

醫藥門

忌銅鐵藥

玄參犯銅鐵餌之噎人喉喪人目○地黃犯銅鐵令人腎消髮白○何首烏忌銅鐵(犯鉄)則必患三消柴胡湲石子并忌銅鐵宜用竹刀○肉豆蔻勿令犯鉄○桑白皮忌鉄及鉛犯鉄則患三消○桑枝木瓜苗根并忌鉄鉛宜用銅刀○菖蒲犯鉄令人吐逆宜用銅刀竹刀○香附切忌犯鉄宜於石臼中搗○杜冲忌鉄宜新瓦上乾木臼中搗○天門冬

麥門冬知母犯鉄則患三消○黄栢牧丹皮益母草忍冬草桒寄生石榴皮葉根草龍膽桃奴地骨皮猪令骨碎補白馬莖并忌鉄

諸藥食忌

服藥通忌生菜○餌藥之人食鹿肉必不得藥力盖鹿恒食觧毒草能制諸藥耳○服諸藥不可多飲醋○服藥不可多食生胡荽及蒜果雜犬肉肥羮魚鱠等物○凡使一切角大忌鹽○有伏令勿食酸醋物一云忌米醋盖服伏令而喫醋則前功具廢○有細辛勿食生菜○有鱉甲勿食莧菜○有

常山勿食生葱菘菜○有桂勿食生葱○蜜忌生
葱萵苣○蓮花忌地黃及蒜○射香忌大蒜○有
牧丹○勿食生胡荽又曰牧丹皮忌蒜○有地黃勿
食葱蒜蘿蔔○有何首烏勿食蘿蔔無鱗魚服地
黃何首烏而食蘿蔔則能耗諸血髭髮早白○有
术勿食大蒜胡荽桃李雀蛤青魚酢食桃或死○
有甘草勿食菘菜海藻猪肉一云食甘草而食菘
則病不除○有黃連吉更勿食猪肉服黃連至三
年則不得食猪肉一生黃連又忌冷水○胡黃連
忌猪肉食則漏精○有蒼耳忌食猪肉米泔○有

巴豆勿食蘆笋羹野猪肉及醬豉冷水○有牛膝
勿食牛肉○有商陸食勿犬肉○有藜蘆勿食狸
肉○破故紙忌羊肉○有半夏菖蒲勿食羊肉海
藻飴糖○陽起石忌羊肉○銀及水銀輕粉忌一
切血○有朱砂空青勿食生血物○龍骨忌魚○有
麥門冬勿食鯽魚○有天門冬勿食鯉食誤食中
毒則浮萍觧之○枸杞其乳酪相惡○乾漆忌油
脂○服黄精禁食梅實○猪膏忌烏梅○杏仁忌
粟米○當歸忌熱麪○威靈仙忌茗及麪湯○厚
朴忌豆食之動氣○烏頭天雄忌豉汁○

臘藥用法

清心元○治不語恍惚煩鬱痰熱傷寒發熱心氣不足神志不定一切病發熱等證又治卒中風不省人事痰涎壅塞精神昏憒言語蹇澁口眼喎斜手足不遂每取一丸温水化下

蘇合元治傳尸鬼氣卒心腹痛霍亂時氣瘴瘧暴痢赤白月閉痃癖小兒吐乳大人狐疝等疾大能順氣化痰又治一切氣痰及中風上氣〻逆氣鬱氣痛○有龍腦則名龍腦蘇合元每用四丸早朝空心井華水下或温酒下

牛黄涼膈元○治上焦壅熱風痰蘊積口乾喉痛唇
焦頰赤口舌生瘡渴而不安用一丸又治小兒急
驚用半丸并薄荷湯下又治咽喉腫痛口舌生瘡
頷頰赤腫熱痰壅塞

加減薄荷煎元○治頭目眩昏口舌生瘡痰涎壅塞
咽喉腫痛除風熱消瘡化毒去風熱咽喉腫痛一
名龍腦川芎丸每用一丸噙嚥之

龍腦膏○治證與薄荷煎元同

神補元○治諸氣注痛又治心膈痛腹脅痛腎氣痛
每五七丸干湯溫酒化下

感應元○治虛中積冷氣弱有傷飢飽飲食心下脅間堅滿霍亂嘔吐久痢赤白膿血相雜米穀不化中酒嘔吐惡心頭旋四肢倦怠姙娠傷寒小兒傷滞赤白或進或退連綿不絶又治積痢久痢赤白膿血相雜每用一丁米飲調下或作丸菉豆大十丸吞下

温白元○治心腹積聚癥癖積年食不消下黄疸鼓脹十種水氣八種痞塞五種淋疾九種心痛遠年瘧疾及癥七十二種風三十六種尸疰癲狂邪祟一切腹中諸疾温酒或井華水下

好合茵陳丸○治天行病惡黄疸及瘴癧發黄三丸
或五丸温水下
九味清心元○治諸與清心元大同小異治熱之切
九九
尤捷○
至寶丹○治中風不語諸毒山嵐瘴氣蠱内水毒産
後血暈悶亂難産又治小兒諸癇急驚卒中客忤
不得眠煩燥風搐毎用二三丸至五丸人参湯下
或小便和薑汁用又治卒中急風不語不省人事
及風中臟精神昏冒
至聖保命丹○治小兒胎驚内弔腹肚堅脹目睛上

覩角弓反張一切惡慢驚風痃涎等證又治惡慢
驚風及胎驚天吊初生小兒半丸乳汁下周歳兒
一丸薄荷湯下十歳以上二丸薄荷湯下
○催生丹○治産婦生理不順産育難或横或逆艱
每用一丸温水下
水煮木香膏○治脾胃受濕臟腑滑泄腹痛無度腸
鳴水聲不思飲食每欲下痢裏急後重或下赤白
便膿又治一切諸痢每一丸水一盞棗一枚同煎
四五沸和滓食前服
九痛元○治九種心痛及卒中惡腹脹痛口不能言

又治連年積冷流在心胸并墜落傷損又治九種心痛及積冷心胸痛三五丸温酒下

瀉青丸○治肝熱急驚搐搦每用半丸或一丸竹葉擂湯或砂糖水化下

稀痘兎紅元○初生小兒二三丸乳汁送下一歳兒五丸或七丸三歳十五丸久服則遍身發出紅斑是其驗也臘日或初八日為丸

錢氏安神丸○治邪熱驚啼心痞面黄頬赤壯熱又治急驚風及心熱驚啼每用一丸砂糖水化下

木香保命丹○治諸風眩暈中風口禁手足偏枯頭

目昏睛心神恍惚及諸般冷氣又治中風一切諸
證每用一丸細嚼酒熟水下或沉酒服之
捉虎丹○治四氣為脚氣無問遠近一切注痛臨發
時空心一丸趕到脚面上必赤腫痛不散再服一
丸趕到脚心中出黒汗乃除根又治中風癱瘓手
足麻痺不仁偏枯不得屈伸每用二丸温酒下
保安丸○治産前産後諸候每用一丸温酒下
紫金丹○治蠱毒桃生毒狐狸鼠蠎悪菌河豚死牛
馬肉毒山嵐瘴氣毒諸藥金石草木鳥獸百蟲一
切諸毒自縊落水鬼迷驚死心頭温者並○冷

水磨灌蛇犬傷酒磨調下每用半錠或一錠薄荷
湯下
靈寶丹○治椎下積滯一切無名惡瘡毒腫每用一
丸冷水下如欲三五行先吞凉水三五口
萬病元○治七種癖塊八種痞滿五種癲癇十種疰
忤七種飛尸十二種蠱毒五種黃疸十二種瘧疾
十種水病八種大風十二種濕痺及積聚脹滿久
遠心腹痛疳蛔寸白諸虫久積痰飲消瘦困或瘦
婦人子臟瘀血凝滯因此斷產服此藥以三丸為
一劑不過三劑其病悉除說無窮盡故稱為萬病

元用之以吐利為度
小兒清心丸○小兒諸熱及驚熱煩燥每用一丸竹
瀝下
抱龍丸○治驚風潮搐身熱昏睡能下痰熱百日内
兒一丸三分用五歲一二丸温水化下
王樞丹○治法與紫金丹同
臈享膏或云蠟香膏治諸涷瘡不差臨用以藥水
先洗後塗諸瘡皆可
神聖辟瘟丹○辟瘟正元焚一炷四季保平安
備急元○治心腹諸卒暴百病已死者折齒灌之中

要客忤尤妙每用三丸

解毒雄黃元○治喉閉口噤水漿不下危急者每用
七丸茶清下若口噤醋和灌鼻

鬼哭丹○治痎瘧每用三十丸隔夜臨睡冷酒吞下
次日早再服

勝金丹○治諸瘧久不愈服法上同

脾寒丹○治諸瘧

安胎丸○治懷孕四五月常墮不安一二丸白湯下

解諸中毒

凡解毒之藥皆不可熱飲能毒使氣愈甚宜冷服之

乃效○手足面青過時者不救治法上宜吐之急
以香油多灌鵝翎探吐之下以芒硝甘草湯調服
利之○人自服毒者宜急救之大法甘草菉豆能
解百毒又法不問何毒多灌香油吐利即安 通
治百物毒細茶白礬每取三錢末新水調服即效
又五倍子為末好酒調下二錢在上即吐在下即
瀉又 甘草細末微炒隨酒量多少好酒服須臾
大吐瀉雖渴不可飲水飲水則難救又臘雪水取
飲之○甘草黑豆皆解百藥百物毒各取五錢水
煎温冷任意服神效或加竹葉或薺苨亦效○凡

中毒卽燒所食之物作末服之

觧一切飮食毒

中毒煩悶甘草薺苨濃煎湯飮之入口卽活又白扁豆末水調服二三錢得利卽安又人屎取汁服之又白狗糞和水絞汁又藍葉或藍實濃研汁飮之又多飮香油卽差

觧熱麵毒

枸杞根皮煮汁飮之又蘿蔔汁飮之無生者則取子水研取汁飮之又杏仁研濾汁飮之

觧豆腐毒

過食腹脹氣塞欲死新汲水多飲即安若飲熱酒即死又蘿蔔汁一云煎湯飲之又杏仁研煎濃汁飲之

過飽幾死着垢組或着垢衣領皮水洗飲之即解

解燒酒毒

過飲中毒面青口噤昏迷不省甚則腐腸穿脅遍體青黑吐下血死在須臾初覺便脫衣推身滾轉之無数吐之則甦又以温湯裸體浸灌常令得煖若灌冷水即死又急取生瓜及蔓搗取汁斡開口灌之不住又碎氷納口中及肛門以醒為度又葛根搗取汁灌口中〇柿葉搗汁灌之

觧諸獸肉毒○

食六畜肉中毒或吐下血胡荽子一升碎煮取汁冷服半升日二又犬屎燒灰和酒服一錢又生韭汁一二升飲之又人頭垢和水服吐出即愈又水浸豆豉絞取汁數升服之○食諸肉中毒煮橘皮汁或蘆葉根汁或黒豆煎汁或大黄煎汁或川椒煮汁可飲○鳳仙花根莖葉取汁飲之又飲好酒大醉即觧又生山藥水磨服神效

食牛肉中毒甘草濃煮飲一二升即愈○人乳汁一二升飲又黄栢末三錢和水服又牛黄和水服

韭汁或人尿汁飲之又人頭垢熱水調服吐出
食牛肉胸間刺痛不可忍手足青黒頃刻間氣絶
者三四即服野人乾一盞無效又服一盞胸間悪
甬如裂有如脱落之聲〻聞傍人其痛即止累試
神效又牛黄五分服之即效累試皆驗○食牛肝
膾忽然咽喉疼痛不可開口視之則喉嗌間毒肉
亂生或如肝尼或如重舌狀頃刻間咽喉閉塞氣
息奄〻悪以鍼亂刺毒肉生處出血一二升呑水
漸差
食馬肉中毒韭汁飲之又犬尿燒灰和酒服又蘆根

煮取汁飲之一二升又多飲好酒清至醉即解濁酒則又加香豉二兩杏仁三兩和莖一炊久熟杵服日二一云只取杏仁嚼吞亦效食馬肝中毒人頭垢和水服又雄鼠屎三七枚研和水服

食狗肉中毒蘆根煮汁飲之又杏仁去皮研水煎去滓飲利下血尽為效一云杏仁二兩和皮研細以熱湯三盞句分三服所食肉皆全從腸出

食羊肉中毒煮甘草汁飲之

食生肉中毒地漿飲之掘黃土地作坎以水沃其中攪令濁俄頃取清飲之是謂地漿

食自死禽獸肉中毒黄栢末三戔水調服不觧再服
又人頭垢一戔熱湯化服又黒豆煎汁藍葉汁人
糞汁皆可服

食中毒箭死禽獸肉中毒貍骨燒灰和水服又黒豆
汁藍汁飲之

觧諸禽獸毒

食鵝鴨肉毒糯米泔或温酒飲之又秫米水研取汁
飲一盞

食雉肉中毒吐下犀角末和水服一戔或以水濃磨
取汁飲之

食野鳥肉中毒狸骨燒灰和水服又黒豆汁藍汁飲之

觧諸魚毒

食魚中毒飲冬瓜汁最驗又濃煮橘皮汁飲之又海獺皮（似獺大如犬毛着水不濡生海中）煮汁飲之又鮫魚皮（皮上有真珠斑堤楷木木賊海中生）如燒灰和水服〇大豆汁紫蘇汁服之

食鱸魚中毒蘆根煮汁飲一二升生汁弁可

食鱔鱉中毒豉一合投新汲水半椀取濃汁頓服即愈

食河豚中毒諸魚中河豚最毒其卵尤毒中者必死急取蘆葦根皮擣取汁飲之或人糞汁或香油多灌吐出即愈又白礬末白湯調下又白扁豆末和水服又羊蹄葉擣汁飲之○藍汁服之又煮桊皮飲之又槐花末三錢新汲水調服或煎服又紫蝦醘或生紫蝦喫之

解蟹毒

蟹未經霜者有毒中之者飲生藕汁冬瓜汁煮蒜汁並佳又紫蘇葉煮汁飲之又黒豆汁豉汁並解之中毒或死急取冬瓜紫蘇葉大黃汁解之即差○蘆根汁解之

觧生膾不消

食膾不消生干汁飲一升即消又曰久不消成癥取水中石子數十枚燒赤投五升水中七次熱飲三五度當利出癥○食厥腦髓即消

觧魚肉不消

食魚肉不消成癥作痛狗糞五升燒存性為末綿裹清五升酒中經宿取清分十服即差　凡過飽魚肉積滞不下者食厥腦髓即消

觧諸菜毒

食諸菜中毒鳥屎燒研末一戔和水服又香油多鷄

飲之卽安又葛根濃煎汁服之生汁尤佳又甘草
湯飲之又人乳汁或小兒尿服二升卽愈

解菌蕈毒

菌蕈夜中先者煮不熟者煮訖照人無影者皆有毒
人中其毒急取地漿飲之又人糞汁飲之又馬蘭
根葉擣汁飲之又人頭垢和水服以吐爲度又六
畜及鵝鴨之屬刺取熱血飲之又油煎甘草冷飲
只多飲香油六好○欲燒鄰灰和水飲之○中蕈
毒吐瀉不止細茶芽（卽雀舌茶）爲末新汲水調服神效
又荷葉擣烟和水服○楓樹菌食之令人笑不止

而死飲地漿最妙人糞汁次之餘藥不能救

解苦瓠毒

食苦瓠毒吐利不止則死飲黍穰灰汁解之○糗米研
取汁飲之卽愈

解海菜毒

凡海中菜多食損人多令腹痛發氣吐白沫飲熱醋卽
安神效

解諸果毒

食諸果中毒桂皮濃煎飲之又猪骨燒灰末一錢和
木服又瓜蒂末一錢溫水調服吐之卽差

食銀杏中毒香油多飲吐之又地漿藍汁甘艸汁飲之

食桃得病取梟桃燒為末和水服即愈

食雜於果子過多腹脹氣急桂心為末飯丸菉豆大以水呑下十丸未愈再服又桂心末五分射香一匁飯丸菉豆大白湯下十五丸即效

治菸毒石首魚多食或煮汁服自消

解諸藥毒

服藥過劑或中毒煩悶欲死葛根取汁飲之或水搗煮取汁服之又藍葉或藍實搗汁飲之又地漿飲

而先飲地漿最妙人糞汁次之餘藥不能救

解苦瓠毒

食苦瓠毒吐利不止則先飲黍穰灰汁解之○稉米研取汁飲之即愈

解海菜毒

凡海中菜多食損人多令腹痛發氣吐白沫飲熱醋即安神效

解諸果毒

食諸果中毒桂皮濃煎飲之又猪骨燒灰末一銭和木服又瓜蒂末一銭温水調服吐之即差

食銀杏中毒香油多飲吐之又地漿藍汁甘艸汁飲之

食桃得病取梟桃燒為末汜水服即愈

食雜於果子過多腹脹氣悶桂心為末飯丸菉豆大以水吞下十丸未愈再服又桂心末五文射香一文飯丸菉豆大白湯下十五丸即效

治芥毒石首魚炙食或煑汁服自消

解諸藥毒

服藥過劑或中毒煩悶欲死葛根取汁飲之或水搗煮取汁服之又藍葉或藍實搗汁飲之又地漿飲

之又生鷄卵取黄呑之又粳米粉和水服之又豉汁飲之○甘草濃煎服又薺苨取汁服又黒豆煮汁飲又甘草黒豆薺苨同煎服之尤佳又韭汁飲之○真黄土煮取汁煖飲之又六畜及鵝鴨皆取熱血飲之即差

巴豆毒令人大吐瀉煩渴發熱急用黄連黄栢煎湯冷服又菖蒲或葛根搗取汁飲之更以冷水浸手足忌食熱物又藍根砂糖擂爛和水服又黒豆煮取汁飲又寒水石磨水飲之

烏頭(即川烏也)天雄附子毒(烏頭烏喙天雄附子側子皆一物也形似烏頭者為烏頭

西岐者為烏喙細長至三四寸者為天雄根中者傍如芋散生者為附子傍連生者為側子
心煩躁悶甚則頭涔々然遍身皆黒必死甘草黒
豆濃煎服入口即定又菉豆黒豆煮汁冷服之又
乾干煮汁冷服之又多飲冷水大吐瀉即愈
草烏毒令人麻痺暈悶甘草黒豆濃煎汁飲之又生
干汁飲之乾干煎汁亦可又童尿飲之
莨菪毒令人大煩悶眼生星火狂走見鬼水研菉豆
汁飲之又甘草薺苨煎汁飲之又甘草黒豆濃煎
服又蟹汁服之
大戟毒即澤漆根也令人冷泄不禁薺苨煎汁飲之又菖

蒲搗取汁歠之
狼毒ニ杏仁研水和取汁服又藍葉汁歠之
藜蘆毒令人吐逆不止葱白煎湯歠之又温湯歠之
又雄黄末和水服又香油灸灌之
躑躅毒令人恍惚吐逆山梔煎汁歠之又甘草黒豆
煎服○香油灸灌之
半夏南星毒生干汁歠之又乾干煮汁服之
苦楝根毒令人瀉不止歠冷粥止之
杏仁毒杏子雙仁誤食必死藍葉汁歠之又藍實水
研取汁歠又地漿歠二三椀又香油灸灌之

川椒毒誤椒食戟人咽喉氣閉欲絶喫大吕三枚䅇之誤呑合口椒氣欲絶身體冷痺急飲井水一二升便差又地漿飲之又飲黒豆汁或人尿葵葉汁或飲之

斑猫芫青毒令人吐逆不止急用𣫍豆或黒豆或糯米起水研取汁服又藍汁飲之又猪肪服之

艾毒艾葉久服亦有毒〻發則熱氣衝上狂燥不能禁至攻眼有瘡出血者甘草黒豆煎湯冷服之藍葉汁菉豆汁飲之

解石藥毒

人服諸石藥中毒人參髓汁服又鴈肪服之又白鴨屎為末和水服

礬石毒黒豆煎汁飲之

雄黄毒防己煎取飲之

硫黄毒令人心悶取諸羊熱血飲之又宿冷猪肉及鴨肉羹冷食之又黒餳煎取飲之

硇砂毒生菉豆水研取汁一二升飲之

砒礵毒令人煩燥如狂心腹攪痛面口青黒四肢逆冷須臾不救急取黒鉛四両磨水一椀灌服卽解如無黒鉛則青藍汁一椀灌服或香油一二升灌

服又人糞汁灸灌之又地漿三椀和鉛粉頻灌旋
刺猪狗羊鷄鴨熱血飲之又臘月猪膽水和服之
立解又稻稈灰淋取汁冷服一椀毒隨利下又冷
水研菉豆取汁飲之又藍根硍砂磄和水服
好白蠟五六錢擂細冷水調灌

解金石毒

中毒者取黑鉛一斤鍋内熔成汁投酒一升如此十
數遍候酒至半斤去鉛頓服○黑豆汁藍葉汁水
芹汁白鴨屎淋汁皆宜

解金銀銅錫毒

金銀銅錫鐵毒服水銀即出又鴨血飲之又白鴨屎
淋取汁飲之又生鷄卵吞之又黒豆汁或藍葉汁
水芹汁飲之〇錫胡粉毒杏仁研汁服之〇鐵毒
者磁石飲之肥猪肉煮冷食之又猪脂服之

解蠱毒

凡有蠱之家門限屋梁無灰塵潔淨當用心防(之)人
蠱鄉遇飲食以犀角攪之白沫疎起者是蠱也遇
食蠱家潛於初下筯時收藏一塊在手盡喫不妨
必須却將所藏一塊潛埋於人行十字路下即盡(蠱)
於其家作鬧蠱主必反來求救或食時讓主家先

動觔或明問主家云莫有蠱麼以觔等卓而後食
則蠱不能為害○中蠱毒者心腹切痛如有物咬
面色青黃或吐或下血不即治蝕五臟盡則死血
死後病氣流注染着傍人○驗蠱法令病人期起
取井水唾水中唾如柱脚直下沉者是蠱也浮者
非蠱也又嚼生黑豆不腥嚼白礬味甘皆中蠱也
又煮一鷄卵去皮日夕含口中勿令破夜吐出着
霜露中朝看色大青者是蠱也　送蠱法取鼓皮
燒為末水調服一錢病人須臾自呼蠱主姓名令
取蠱去即愈又取蘘荷葉密安病人卧席下勿令

知病人自呼蠱主令取去卽愈○取蘘荷葉搗取汁服之（周禮以嘉草除蠱毒嘉草卽蘘荷也）○治蠱法紫金錠半錠重者一錠用薄荷湯化下又服玉樞丹一錠或吐或利而愈又白礬甘草等分為末淸水調下或吐黑涎或瀉下卽安又甘草湯服之又升麻一兩水煮取濃汁服又馬蘭根為末水和服一二錢又柵水北陰白皮濃煎取一升空心服並卽吐蠱又馬兜鈴根為末一兩水煎頓服當吐蠱未快再服又商陸末和水服又續隨子去皮研為末和水服一錢又班猫一枚去頭足翅研為末和米飮服並卽

下蛊又班猫去足翅熬大戟様白皮東引者三物
等分為末冷水調服半錢其毒即下若未出更一
服奇效且單服大戟亦好又蠶退紙不拘多少以
麻油紙撚焼存性為末新汲水調一錢頻服雖面
青脉絶昏迷口禁吐血者即甦又藍葉汁飲之又
茜根濃煎服之又蘘荷同煎飲數升即愈又桔
梗搗汁飲之危重者亦甦又蚯蚓十四枚醋一升
漬之蚓死但飲其汁則下血如爛肝已死者皆可
活又蜈蚣炙為末和米飲服亦可又狐五蔵及腸
和五味煮作羹食之炙食亦良有人病蠱毋有狐

病自消覺而有狐入室烹食遂差○有人在海西買喫鰕鹽患腹痛甚異知其中蠱毒即多飲燒酒乃吐卵食鹽物已蠢動作魚形其病遂愈

解馬毒

馬毒瘡婦人月經血塗瘡仍飲之又生粟及馬齒莧搗付之又飲馬齒莧汁又飲馬糞汁以馬尿洗之又糯米飯冷罨瘡上即愈○馬汗入瘡毒氣攻作心悶欲絶燒粟稈灰濃淋作汁熱者蘸瘡須臾白沫出盡即差白沫即毒氣也又馬汗毒氣引入如紅線先以鍼刺瘡口出血烏梅和核爛研醋調塗

之又馬齒莧取汁飲之又生烏頭末付瘡上良久
黄水出立安又白礬枯黄丹炒等分諸貼瘡上又
馬汗及毛入瘡腫痛以冷水浸瘡數易飲好酒立
愈○開剝死牛馬中毒遍身生紫疱但潰叫痛悪
服紫金錠吐瀉即愈

解煙熏毒

炭煙熏人頭痛嘔吐往〻致死生蘿蔔搗取汁飲之
即解無生則蘿蔔子水研取汁服亦解

治湯火傷

爛瘡痛牛屎濕付之又醋滓付之又醬汁塗之又曰

蜜塗之止痛又蝌蚪擣付又以好酒洗以鹽之付
之又梔子末鷄卵清調塗又大黃末蜜水調塗又
炭末香油調付並即差○凡被火傷即以醋水塗
之仍貼以紙連塗令濕雖至焦爛止痛後又無痕
又毛段燒作末油付又新尿冷飮之以月經水洗
之 取廚下溝水塗之神效○治熱油傷
蕎麥粉멧기를 醋調傳之又寒水石末油調塗之痛止
治金刃傷
金瘡傷重暈絶不省人熱尿灸灌即甦童尿尤好又
傷重痛悶欲死納牛腸中即甦 金瘡血不止急

以石灰末裹之又石灰末和鷄子白火煆為末糝
之立止又梁上塵取傅之又蛇含草擣傅之又壁
錢細蜘蛛取汁點傷處○牛蒡葉入鹽少許擣付藍
葉汁入牛黃麝香少許塗之○失血則當溫熱頂
忍之可與肥之脂物以止其渴○金瘡傷斷一頭
見者不可連兩頭見者可連續之先以鐵鏤續其
斷腸便取鷄冠血塗其際勿令氣泄即推納之
金瘡腸出不斷者急以清油撚活推納之續以桑
白皮作線縫合肚皮取鷄冠血塗之而外重皮則
不縫糝藥仍服通利藥物令二便秘澁若腸與脂

膏俱出用手擘去膏不妨此是闌肉放心去之然
後推腸入納初飲粥清二十餘日乃喫糜粥百日
後乃可進飯　金瘡腸出不能納者小麥五升水
九升煮取四升去滓令極冷使人含噀瘡上及背
則漸入勿令衆人見又新汲水噴之令身噤腸自
入並勿令病人先知○使四人執病人卧席舉搖
之腸自入○乾人屎抹於腸入即自入○凡金瘡
忌嗔怒及大言笑動作勞力及食酸熱酒熱羹鹹
皆使瘡痛衝發甚者即死　凡金瘡及折傷不可
飲冷水血見寒則凝入即死　凡金瘡及墜傷折

膏纏有瘀血停積宜先逐去瘀血花葉石四兩研
黃一兩為末入尾罐內鹽泥固濟晒乾安四方磚
上以炭火從巳午時煆至經宿候冷取出研細先
糝傷處其血化為黃水每取一大水童尿入酒煎
熱調服則臟腑瘀血化為黃水或吐出或下泄
刀斧傷桑白皮剝取裹之冷汗入瘡中又蘸木末
付之蚕貫包付數日如故又急取白梅付之藍葉
汁飲之　治砲矢傷

〈治砲傷矢

戰陣砲矢所傷流血滿體悶絕者牛一隻剖腹納其

人浸血中郎甦○箭鏃入骨不可拔取蟯蜋(쇠똥바리)全者
入麝香少許爲末罨之即出又鼠腦及肝塗之又
螻蛄同硫黄研付自出○毒箭傷芧根搗付之夜
數易藍葉汁飮之

治打撲傷

瘀

瘀在內煩悶欲死蒲黃三戔熱酒調服又白楊樹
皮酒漬飮之又生麻根葉搗取汁飮一升非時則
取乾麻煮汁飮又童尿熱飮一二升即甦又大尿
燒存性爲末熱酒調服二匙大膽一枚分二次溫
酒調服惡血盡下○打撲傷痛不可忍取葱白入

糖火煨乘熱擘皆其中有滯便罨傷處冷則易熱
者須臾痛定又芥子和生干研微炒貼之亦妙

治墮壓傷

凡墮壓死者心頭溫皆可救急安好處以袖掩其口
鼻上一食頃候眼開先灌熱小便又干汁香油攪
句灌之又薤合元三五九溫酒童便調灌即甦
松煙入好生酒灌之○半夏或皂角末吹鼻得嚏
亦甦○被墮壓或舟車轢馬踏牛觸胸腹破腸四
肢攧撲氣悶欲死烏雞一隻合毛杵和醋一升
以新布攝病處取藥塗布上罨定乾則易之覺寒

振欬吐不可去藥須臾復一雞神效又烏雌雞右
翅羽七枚燒灰和酒服當吐血便愈〇墮壓傷瘀
血疼痛取水蛭炒射香等分為末熱酒調一錢
服又稻稈燒灰取新熟和糟酒淋灰取汁乗温淋
洗痛處立差

治骨折筋断

折傷筋断骨碎生地黄取汁和温酒服滓付患處又
生地黄熬之裹傷處一日一夜十易一月筋骨連
續又取蟹脚體皮殻中黄微熱納瘡中包裹即連
筋骨又取牡鼠生搗付之三日一易又蒿苣子微

炒末酒服二三錢能接續筋骨　骨折取自然銅
火煅醋淬七次研極細水飛同當歸沒藥末各半
錢溫酒服仍以手摩傷處此藥直入骨損處束調
之神效此藥新煅者有毒若不折骨不碎骨則不
可用○山梔生為末五分飛羅麵三錢干汁和搽
患處一日夜皮肉青黑是其驗也○腦頭破蔥白
和蜜細研厚封損處立差又取夜合樹皮去麤皮
剉炒黑色四兩芥菜子炒研一兩末每二錢熱酒
調服澄清臨臥飲滓罨傷處妙○被斫筋斷急取旋
覆花根搗汁瀝瘡中滓付傷處半月便續

治手足折傷

手足折傷出臼痛不可忍急用白礬末一匙和沸湯一椀乘熱熏洗傷痛處止若出外則須搦入內若出內則須搦外外着骨歸舊臼葱頭粉尾上炒紫色熱酒醋同調成膏貼傷處用桑木或柳木片夾定麻繩縛扎時時解扎挽屈拽直否則愈後曲直不得成痼疾○接指方蘇木為末敷於斷指間接定外用蚕繭包縛數日如故○跌傷作腫痛不可忍梔子白麵為末水調搽之乾則灑水即效

治肢節脫解

四肢節脱但有皮連不能舉動名筋解黃芪三兩酒浸一宿取出焙乾為末每二錢酒下

治耳鼻舌傷断

治擦落耳鼻用油髮灰末乘熱以所落耳鼻蘸髮灰綴定以軟帛縛定神效○頗作穿断舌心血出不止取米醋以雞翎掃断處其血即止仍用蒲黃所杏仁鵬砂少許蜜調噙化而愈

治陰囊傷破

有人落下破所佩鎖匙傷破陰囊二丸脱落然掛未断痛苦無任下懷夜其人漸漸托上然取壁錢數

貼傷處日漸就安其囊如故

治杖傷

杖傷忽乾黑陷毒氣攻心恍惚煩悶嘔吐者危凡杖畢即用童便好酒各一鍾合而溫服免血攻心甚妙仍用葱白搗爛炒熱搽杖處冷則易之止痛散瘀如神又方豆腐鹽水煮熱鋪杖處其氣如蒸豆腐即紫復換貼之以色淡為度潰爛者亦宜又鳳仙花連根葉搗爛貼之乾則易一夜血散即愈又痛甚者以熱酒盡量而飲刺出惡血以大黃〻柏為末生地黃汁調付之　大黃為末童便調頻付

之、治人咬
人咬成瘡龜板或鱉甲燒灰油調付
治熊虎咬
熊虎爪甲傷嚼生栗付之○熊傷人煮渴根取濃汁以洗瘡十遍擣葛根為末調葛根汁服日四五次
○虎咬傷生葛根汁飲之又洗瘡又杵蘿取汁飲一升日三澤付傷處又飲清油一碗白礬為末納傷處又飲酒常令大醉當吐毛出良又砂糖水調服一二碗并塗傷處又生鷄肉食之又月經赤衣

焼為灰和酒服一方月経衣灰酒服方寸匙日三○月経衣布付之傷脣又白礬末納瘡中裹之

治牛腡膓出

膓出不断者悉以清油摸膓用手推入以桑白皮尖縫合肚皮縫上糝血竭末或百草霜末○以熱尿常洗之或枸杞根皮煎湯洗之妙

治馬驢騾咬踢

馬或驢咬人取其尿洗瘡以糞塗之又飲糞汁佳○馬咬踢取益母草搗爛和醋炒付又獨顆栗子嚼付之焼灰貼亦妙又取鷄冠熱血塗之又用艾灸

傷處取人尿或馬尿燒灰為末付之○被騾跑倒
又咬傷膿潰臭惡蛆蠅極盛服蟬花散

一治犬傷

春夏初交犬多發狂但見其尾直下不捲口中流涎
舌黑者即是狂犬若被其咬九死一生急用鍼刺
去血以熱小便洗淨即殺所咬犬取腦付之或用
杏仁嚼爛付之以帛繫定或同馬藺根研細葱湯
洗後塗之急用班猫七介去頭足翅為末溫酒調
服其毒必從小便中出可將尿缸盛清水令患人
尿其中停半日見濁氣凝結如狗形則毒既出無

則須服七次極驗若小便澁益元散水調服一方
斑猫七日内用七箇七日外毎日加一箇十日十
箇百日百箇去翅足糯米同炒滑石一兩雄黄一
錢麝香二分半為末温酒調服不飲酒者米飲下
毒從大小便出即愈　患人頂心有一或云二三紅髮
即拔去後服藥快效又常食杏仁以防其毒或作
粥食之又常食韭菜常飲韭自然汁又葛根汁飲
之又蚯蚓糞封咬處出犬毛神效○咬瘡久不差
口吐白沫叫嗅似犬聲為犬毒入心也蜡蜍作膾
食數次勿令之又取後兩腿搗爛酒調服亦可又

虎頭骨虎牙虎脛骨為末酒調服二戔　虎膽和
水服久黒豆煮汁飲　治法無出於灸只取咬牙
跡上一日灸三社至一百二十日乃止永不再發
一方連灸假三日旬合完合　禁忌法被咬者終身禁食犬肉
及蠶蛹此毒再發則不可救三内忌食一切毒年
物及房事又忌飲酒

治猪咬

屋漏水洗之又松脂作餅付之

治猫咬

取薄荷葉細嚼付之又虎骨虎毛燒為末塗之

治鼠咬

取猫毛燒灰麝香小許津唾调付○猫糞塗之○生
手擦猫口取涎塗之

治蛇咬

蛇咬頻塗人乳汁又青魚白帀泥水待潤貼之即效
治蛇毒無如雄黄取末貼瘡口立效又萵苣細
汁和雄黄末貼瘡口毒水流出腫毒即消又即以
白礬火上熔汁滴咬處立瘥無白礬則蒜作艾炷
灸五壯良久中蛇毒服黑口噤飲兎蒼耳嫩葉一
掿擣取汁温酒和灌之滓付瘡上又白芷末麥門

冬湯調服滓付傷處又毒蛇螫處以熱人尿洗出
血次取口中唾塗之又人尿孚付布裹即消又取
急飲好醋二椀々毒氣不隨血走清油亦可又凡
蛇毒取獨頭蒜或小蒜或水蓼或若萱或豆葉或
荏葉取汁飲滓付之又生蝦蟆搗付又生鷄卵敲
作一小孔合咬處又牛耳中垢猪耳中垢取付之
○即刮自己耳中腦子納傷處○頁禾和冷水服
又和水作餅付咬處皮浮氣去處即消神效 忌
食酸物梅子犯之必大痛○蛇入耳鼻口中挽不
出急以刀裂蛇尾納川椒一云胡椒二三粒裹着即出

又以艾灸蛇尾即出又割母猪尾頭瀝血入口中并孔中亦出後取雄黃末調人參湯服制蛇毒○蛇繞身不解以熱湯淋之無湯則令人尿之即解○毒蛇尿草木着人似刺劄便腫痛肉爛若着手足指節隨落研砒礵和膠清塗之○蛇骨刺人腫痛燒死鼠為末付之○大豆葉擣付

治蜈蚣咬

取蜘蛛安咬處當自吸毒蜘蛛死即投水中救活更用生者吸之又烏鵲血及尿乾則水調塗之又獨頭蒜研塗之。蝸牛取汁塗之○桑白皮取汁塗之又又上

地龍汁塗之又木米作并餅付○雄鷄冠血塗之

治蜘蛛咬

蜘蛛咬人腹大如孕瘡中出絲屢有死者惟飲牛乳可制其毒又蜘蛛咬遍身成瘡飲好酒大醉患吹肉中小如米自出又青葱葉去尖納蚯蚓一條緊捻頭勿通氣候化水點及處即差又藍汁一椀入雄黃麝香末各一錢和之細飲其汁并點咬處腫痛甚外者即愈只服藍汁并好又桑白皮汁塗之又鷄冠血塗之又鷄卵敲作小孔合咬處立差○醋磨生鐵塗之○壁鏡一名壁錢即細蜘蛛咬毒人必死桑

灰淋濃汁調白礬末塗之又醋磨雄黄塗之

治蠷螋傷又（名八角虫如○蜈蚣色小 青黒長足踏号影子虫）

此虫隱𣏌壁間以尿射人遍身生瘡如熱痱而大繞腰匝不可療烏鷄翅燒灰鷄子清調塗之又取扁豆葉挼付即差又鹽湯淋漬瘡上数日愈又鷄尿塗之

治蜂螫

青蒿嚼付之又薄荷挼貼之又芋莖挼擦之又冬瓜葉挼付之○酒糟或醬罨傳○醇酒塗之又薄荷搗付

治雜虫咬傷

蝸牛咬人毒遍身者蓼子汁浸之即差　螻蛄咬人石灰醋和塗之

天蛇（即草間黄花蜘蛛也）毒人被其螫因為露水所濡乃成瘯似癩而非癩煮秦皮汁飲之差

蚯蚓咬鷄屎塗之又急煎鹽湯浸洗

五毒虫毛螫赤痛不止馬齒莧挼付之

諸毒虫咬傷大紙撚蘸香油燒火吹滅以煙熏之即愈又小薊或藍葉搗汁飲又付之　香油浸紫蘇塗之

諸傷辟蠅蛆法

夏月諸傷損潰爛蛆蟲極盛臭不可近蛇退燒存性一兩蟬殼青黛各五叏細辛三錢半為米每三錢黄酒調下日二各曰蟬花散服之蛆皆化水而出蠅亦不敢近又寒水石治夏月諸瘡臭爛

治諸蟲入耳鼻

取韭汁或葱汁或薑汁或麻油灌入并即出〇牛乳或雞冠熱血灌入亦出〇生薑擦猫鼻其尿自出滴入即出又桃葉作枕之亦出又取小銅器放耳邊敲之亦出〇取鏡與陶器打作聲亦出

治蜈蚣入耳

取干汁韭汁藍汁灌入即出或猪脂或牛脂炙令香置邉亦出

治蚰蜒入耳

取牛乳滴入即出又蝸牛汁或小蒜灌入即出汁又地龍入葱葉中化為水滴入其蟲即化為水

治蟻子入耳

取醋灌入起行即出又穿山甲燒米水調灌入又炙香肥脂或油煎餅枕卧即出○猪肉一指許炙令香取置耳孔邉即出又燈心浸油鉤出

治誤吞諸虫

誤吞蜈蚣在喉閼甚急取生豬肉吃之須臾以清油灌口中即吐出繼以雄黄末水調服解毒

誤吞蚰蜒飲牛乳二升自消下

誤吞水蛭取田中乾泥小塊小死魚三四箇將豬脂溶句用巴豆十枚去皮研爛入泥内為丸如菉豆大以田中冷水吞下十丸蛭皆瀉下而愈又濃茶多飲自下又食蜜即下為水

治誤吞諸物

誤吞鈎鈎連綿著莫引之引急取珠璫或琥珀珠水晶

珠蕙汯子推至鉤所引之自出○市上所在火珠可用蓋其鉤尖入於珠孔而不礙也

誤吞鐵磁石如棗核大磨令光鑽作竅絲穿令含鐵自出又吞豌（一方豌豆）煮熟同韭菜喫之鐵與菜從大便出

誤吞鐵釘箭鏃多食猪羊肉肥脂物必自裹出又多食肥猪肉蔡菜自出又豌豆煮熟同蔡菜喫之從大便出

誤吞釵環竹木簪白暴令萎黄煮熟勿切食大一束釵即随出又多食飴糖至數斤當裹環釵竹木而

出

誤吞金銀取水銀半両服之金見水銀如泥消出

誤吞鐵物銅錢忽食葧薺一名烏芋生湿地須史自化出

誤吞鐵銅堅炭為末米飲調服從大便瀉出如烏梅状又縮砂濃煎飲之其銅自下又多食胡桃其銅自爛又服煉蜜二升即出

誤吞木屑搶喉欲死鐵斧磨水灌之

小児吞錢不出煮蔡汁冷飲即出根葉子同功

誤吞桃李鯁喉不下狗頭煮湯摩頭上差

誤吞髪繞喉不出亂髪灰水調一錢服又旧木細梳

末酒調服

○治諸骨鯁在咽

諸骨鯁在咽不下嚼薤白令弃以繩繫中呑到鯁處引之鯁即隨出又用韭白如上法以茶嚥下引之亦出又蝸牛或鹿筋搥軟如彈丸持筋端呑之候至鯁處徐々引之鯁着筋即出又弓鉉（綿絮）一小塊以蜜煮用如上法即出又弓絃搥令頸散呑引之亦出○威靈仙為末酒服又好醋呑嚥長在喉中不久消化○魚骨鯁在咽喉（取）鳳仙花（無則用根）水研取汁以匙送下可不犯齒恐致損傷又魚狗鳥（小鳥青似翠水）

上取魚食故名為鱼狗俗号金鳥燒灰和水服又萱草根汁飲之
又縮砂甘草末綿裹含嚥即吐出又飴糖作丸如
雞子黄大呑之若不下大作丸嚼下之又鱖魚鯽
魚鱧魚膽皆下骨鯁臘月收者又佳取皂子許温
酒化呷之得吐便出未吐更飲温酒以吐為妙未
出更服又鯉魚鱗魚燒作屑和水服即出○王贊
花醋煮不着壼呑下○大蒜塞鼻即出又鹿角含
之津嚥下○東流水一盃東向坐以手指水上書
龍字訖飲之○魚骨鯁在咽取桑木上虫屑醋煎
灌嗽自下又將狗倒懸牙起涎出徐徐嚥下其骨

化為水如神又虎骨為末水調服或煮汁服狸骨
亦可為象牙磨服即下又鵝足一對燒灰水調水
服○鯉骨在咽野苧根洗淨爛搗以泡服櫻桃大
以鵝羨化下立出又白梅肉搥成大丸綿裹用線
穿在内冷藥送下扯住綿頭在手一嘔即出
○治芒刺在咽
竹木在咽取螻蛄腦吞之即下又鼠腦厚塗喉上即
出又鯽魚膽和酒服即出　鯁魚膽和酒服即出
稲麥芒在咽腫痛急取鵝口中涎灌之即出又脂麻
炒為末湯點服妙

治諸物入目

稻麥芒在目不出白蘘荷(有赤白二種白者入藥)根莖取汁注目中即出　稻麥芒入眼以新布覆眼上取蠐螬從布上摩之其芒出着布良　麥芒入目煮大麥取汁洗之即出　栗殼煎水頻洗　栗殼刺入眼蠐螬取汁注之○

沙塵諸物入眼腫痛不得開取牛筋搥擘如絲着睛上輕挼之自出又好墨濃磨點睛上以新筆繳出妙又取蟯蜋一枚手持其背於眼上影之沙塵自出衣魚以乳汁研和注目中自出○雞肝血注之

飛絲入目腫痛不得開好墨濃磨點入目中閉少時其絲自成塊着在睛上却用綿輕輕惹下卽愈又頭垢點入目中又剔人爪甲上細屑以箭頭點津唾蘸屑入目中其絲自聚拔去之又石菖蒲搥碎左眼痛則塞右鼻右眼病則塞左鼻神效　菁菜汁點之又鹽炒細末點之

治飛絲入口舌間

飛絲入口舌間生嚼藕葉以白湯下之立效

治匙着口中舌間

飛絲入口舌間生嚼蘇葉以白湯下之立效

匙之自着口中漸引入不觧落者由於胃熱悪鍼三里即落○又灸匙頭七壮即落

治諸物入肉

鍼

鍼入肉不出烏鴉翎三五枚焼灰醋調罨之自出又取雙仁杏爛搗車脂調罨自出又螻蛄脳同硫黄研傅裹定自出又鼠脳及肝塗之自出又磁石著其上自出○鍼刺竹木刺入肉不出鼠脳厚塗之即出

竹木刺入肉不出螻蛄研付之妙又蠮螉（即螻蟻乃黒色細腰蜂也）生研付之亦妙又蠐螬研付之即出又乾羊尿

燒灰和猪脂塗之不覺自出又烏雄鷄生搗罨之自出又人頭垢（一名百齒霜　在梳上者是）塗之又栗楔生嚼罨之又牛膝根爛搗塗之并即出○蒲公肉取白汁多塗之又松脂自流者爲末裏定自出

魚骨入肉不出嚼吳茱萸付之骨當爛出又象牙末厚塗自軟出又魚狗鳥燒爲末和水頓服又海獺煮汁服○白梅肉爛研付之又魚鰾傅之四封肉爛刺即出

治魚骨在肚

魚骨在肚中刺痛呉茱萸煎汁一盞飲之骨軟而出

治鬼擊

得之無漸卒着人如刀刺狀胸腹㽲痛不可按抑或吐衄下血者謂之鬼擊○犀角五錢朱砂麝香各二戔半為末每二錢新汲水調灌○以好酒吹納兩鼻即差○雞白屎麻一握酒七升煮取三升熱服發汗汗不出則熨斗盛火照兩脅下汗出即愈○血滿腹中煩滿欲°雄黃末吹入鼻中又酒調死一錢服日三能化血為水○灸人中立差不差則更灸○灸臍上一寸臍下一寸七壯

治鬼魘

人到客館及久無人冷房睡中為鬼物所魘但聞其吃吃作聲便令人叫喚不醒乃鬼魘也不急救則死不可近前急喚但移動些少臥處徐徐喚之又不可以火照之若元有燈則存之無燈則切勿點燈痛咬其足跟及大拇指甲邊多唾其面一云以水噀面仍用竹管吹兩耳又取半夏末或皂角末吹兩鼻中即活○梁上塵吹入鼻中又以新筆尖刺鼻孔男左女右轉輾運動則即起○宜用麝香蘇合元○伏龍肝末二錢井水調灌服更取入鼻中又生韭汁灌口中及耳鼻薤白汁亦可○若仰臥以手

覆心則魘不得悟但捻下心上手然後徐徐喚覺傍人手及他重物皆然火法宜與鬼擊同治

治客忤猝厥

客忤者中惡之類也多於道間門外得之令人心腹絞痛脹滿氣衝心胸不即治亦殺人取百草霜五錢鹽二錢和研溫水調下○又取鹽雞子大青布褁燒赤研納酒中頓服當吐惡物又取細辛桂心爲細末納口中○蘇合元以干汁或溫酒或童尿調灌○熟艾一兩水煎取汁頓服即差○銅器或瓦器盛熱湯用厚衣襯腹上於衣上熨之冷則易

便愈○以皂角末吹鼻或研韭汁灌耳中灸臍中百壯

治尸厥

尸厥者卽中惡之類身脉皆動而形神無知其狀若尸故名尸厥凡弔死問疾或入墓發塚卒中邪惡手足逆冷頭面青黑牙關緊急暈倒不知人或錯言妄語又腹中氣走如雷鳴聽其耳中如微語聲者是也急取蘇合元三丸溫酒或薑湯灌下又取故汗衣燒末又菖蒲汁灌口中又薑汁半盞酒一盞煎百沸灌下仍以竹管吹其兩耳卽甦○鍼人

中至薑立甦灸百會七七壮氣海関元各二百壮
治痰厥
痰厥暴感不省人事喉中如曳鋸聲急取清油多灌之即吐痰而愈又竹瀝和干汁少許多灌之又清心元一丸調竹瀝和干汁灌下又鷄子黄三枚和童溺灌下并即甦
治食厥
食厥者多因飲水過度飲食之後或着氣惱變為異常急暴之症口不能言目不識人四肢不擧急煎干鹽湯多灌探吐之即甦

治蚘厥

蚘厥之症心腸疞痛暴作暴止悪心嘈亂時煩嘔吐冷涎青水面色青黄口唇紫黒色變不常者是也若貫心則殺人甚急使君子肉一両水煎服又苦楝根白皮一両濃煎調檳榔末一銭五更頭頓服凡上半日虫頭向上前一日不食夕飯至夜半後先炙猪脯令香臭薾鼻即細嚼嚥汁随即虫飢求食之也痛時則不拘方痛之時不宜時飲食且食甘時則痛復極禁虫食甘則起食酸則酔食辛則伏食苦則止〇酸石榴根皮二斤檳榔十

枚水七升煮至二升去楂以粳米煮稀粥平朝空
腹食之少間虫並死快利　苦楝根去麁皮取白
皮二両水二椀煎至一椀半去楂用晚粳米三合
煮糜空心服〇服藥殺虫法先以炒肉一二片粥
吃引虫向上然後進藥粥一二口少頃又吃一二
口漸〻加至一椀或二椀其虫盡下　三虫未食
病〻後腸胃空虛三虫求食〻人五臟者謂之狐
惑殺人甚急上食肺係則喉門騷痒下食大腸下
口則肛門騷痒令人不能堪以合歡木燃窰而坐
於曲突之上使其煙入肛門又使入口即差

治氣厥

氣厥多生於驕貴之人因事激惱忿怒盛極不得宣泄逆氣上行忽然仆倒不省人事牙關緊急手足攣搐狀中風但口內無涎聲為異急用蘇合元如或便香附子末二錢干湯調服則即蘇不可用離藥

中氣與氣厥同與因人相爭暴怒氣逆而暈倒也氣脉多沉風脉多浮風中身溫有痰涎氣中身冷無痰涎急用干湯灌救○若中氣而用中風藥治之多致殺人

猝上氣（乃大虛氣聚肝藏之病也）喉開其聲如鼾有如痰在喉響者此為肺絶之候宜用人參膏救之用千汁竹瀝放開頻服之如未得參膏先煎獨參湯救之早頻者十全七八次則十全四五遅則十不全一

治中風

猝然昏仆不省口眼喎斜手足不遂急以手大指爪甲掐刻人中皂角末吹鼻即提起頭頂髮候其噴嚔有嚔可治無嚔不可治口噤則以烏梅肉和南星細辛末頻擦牙口自開　取竹瀝三合千汁一合調清心元一丸或龍腦蘇合元三丸灌口中或

多灌香油即甦　不省人事涎潮不淂語者側栢
葉一握葱白一握并根細研如泥好酒一鍾同煎
一二十去滓溫服　風痰壅盛者口眼喎斜不沸
能言語者皆當吐之輕者取瓜蒂末一錢溫水調
服重者取藜蘆五分入麝香半錢為末韭汁調服
如不吐再服之○用白礬二錢生研作末生千自
然汁調和開口灌下其涎或化下便醒○口吐或
眼喎斜向左則右灰水調即於右邊塗之向右則
左邊塗之候其方正如旧即以水洗下大效○身
如角弓張四肢不收煩亂欲死者清酒五升鷄反上

白矢一升鵠節和合搗之千遍乃飲之壯者服一升日三度弱者服合差○灸足大指横紋隨年壯立愈

治中暑

夏月在道中中暑死者及昏冒痰厥吐瀉喘滿大渴汗出頭疼煩燥欲死者急扶在陰凉處取道中熱塵土積心上及臍上作窩令人尿其中即活○以布巾衣物蘸熱湯熨臍中及氣海續以熱湯淋布上令暖徹臍腹如倉卒無湯掬途上熱土積於臍上冷則易之○以新汲水滴兩鼻孔以扇〻之重

者也猥灌之即醒若與冷水飲即死　生干一大
塊或大蒜一大瓣水研灌之○童便或清濁和水
灌之又生馬通絞汁灌之蓼葉香薷煎灌又石膏
一兩煮取汁灌之即差○取大蒜一握路上日曝
土雜研以新汲水和之濾去滓灌之藥到腹中即
甦此神人備急方也○使人嘘其心令煖易人為
之○槐花軟葡濃煎服即效後不復發　真末調
冷水服蜜水亦可○如驚悸妄言辰砂益元散井
水調下

治中寒

傷寒有卽病有不卽病以漸而深中寒則其病卽發而昬暈倒口噤四肢強直拘急嘔吐涎沫脉浮緊或微或無若不急治死在朝夕急舁置煖室以手灸火摩病人臍腹間取熱酒干汁各半盞灌下兼用葱白二三升分二包炒令極熱互熨臍上冷則用水拌濕更炒熨之〇冷極唇青厥逆無脉陰囊縮者急用葱白連根切小麥麩各三升鹽二升以水和匀炒熨臍上如上法又灸臍中其氣海関元各三五十壯一云氣海関元各灸二三百壯而脉不出手足不温者死

治霍亂

增寒壯熱頭痛眩暈心痛腹不可忍不得吐瀉謂痛之乾霍亂吐瀉不止謂之溫霍亂世乾者以吐瀉為主鹽一兩生薑切半兩同炒色變以童尿二盞同煎至盞一分二次服吐下即愈又鹽一大匙熬黃取童尿一升溫和攪服又鹽湯一椀入皂角末少許調服探吐又沸湯和新汲水服之能吐宿百食惡毒之物和鹽服之尤妙又鹿皮或獐皮熏煙最多黃色者水浸揉取汁頓服即吐又飲醋一二升吐下○多飲冷水蜜水吐下為佳若痛不止兩

服再吐立效○凡霍亂吐瀉不止者香薷林擒清邑
者皆可煎服又鍋底墨二錢百沸湯一盞投其中
急攪服吐瀉立止又生干五兩切牛屎一升同煎
取汁服即效○牛馬屎絞汁服一杯或炒熱綿裹
着小腹 吐瀉過多四枝逆冷不省人事南星末
三戔呂三枚干五庬同煎服極熱〻一服可效或半
夏末干汁點服或白礬末一戔沸湯點服亦效又
霍香陳皮各五戔水煎溫服 霍亂吐瀉之時切
勿與穀食雖米湯粟入胃立死少得吐瀉止過粥
半日飢甚方可與稀粥以漸而將食 霍亂轉筋

吐瀉過多遍體轉筋手足厥冷氣欲絕者急取香
薷暑藿下可開或木瓜枝葉亦可或秫葛葉治轉筋々寧擂度大如桃李不
可忍或蘆花煎服又取蓼一把濃煎乘熱熏洗因
有服一二盞一法男子以手挽其陰牽之女子則
挽其乳近兩傍牽之此千金方妙法也關衝穴
鍼刺出血即差穴在無名指外邊去爪甲角韮用韮葉連肌膚男左女右轉
筋欲絕以鹽填臍中灼艾不計壯數立效藿亂已
死而臍中有煖氣者依此灸之亦甦

治攪腸沙

此證心腹絞痛冷汗出脹悶欲絕俗謂之攪腸沙與

乾藿亂同或如傷寒頭痛嘔惡渾身壯熱手足指末微厥或腹痛悶亂須臾不救由山嵐瘴氣或因飢飽失時陰陽暴亂而致也先濃煎艾湯試之如吐即是也蠶退紙燒為末熱酒調服立效又多飲鹽湯吐之亦愈又法以鍼刺其手指背近爪甲半分許血出即先要自兩臂按摩下其惡血令聚指頭刺之又法以手蘸溫水於病者膝內打拍有紫黑點處以鍼刺去惡血愈。又法兩臂腕中有筋即必致黑色用砭鍼擊刺出紫黑血痛即止　近海之地有一惡病症似藿亂土人名之曰殺腹痛不

急治則能殺人其治法以縧緊縛兩臂中節之上下則青黑脉突起作尺澤延屬而或兩臂也出或只出一臂隨其突起以針刺之出血如射其病即止百不失一沙與殺音相近臂腕出血之法又與之同所謂殺腹痛似是攪腸沙也

治疝痛

小腹痛不得大小便名曰疝疛痛自臍下上衝名曰奔豚○凡疝痛上連胸脅甚則外腎縮入吸丹叉張冷汗如洗須臾不救取川烏梔子仁并炒各二錢酒水合半盞同煎入鹽一撮或加墓服之效又沙

蔘或桂心或橘核或葱白或玄胡索或牛陰莖或末服或渴服即差沙蔘常服至妙○貂皮或貂鼠四足燒灰酒調服青鼠足黃獮足亦好又茴香莖葉搗取汁熱酒各一合調服即差又蜘蛛散蜘蛛十四枚熬因桂五錢為末大人一錢小兒五分空心酒下或蜜丸服之甚妙○炒鹽熨痛處○灸獨陰在足第二指節下橫文一云在足大指次指下中節橫文當中灸五壯男左女右千年尾三七箇碎作麥子大列置臍下至橫骨上灸之以陰囊出汗為限　小兒胎疝偏墜囊縫後十字紋上灸三七春灸夏差夏灸冬差又癩疝鈹針取睪囊中水液或纖液即愈靈樞真訣也

治吐血

吐血危重者百草霜末三戔井水調服即止又蒲黄炒三戔冷水調服又松煙墨濃磨汁飲之又韭菜汁飲之又生地黄生藕生梨搗取汁磨墨徐〻服之即止　藍葉汁服之

治衂血

衂血不止者百草霜末三戔水調服又吹鼻中又萱草根汁一盞生干汁半盞相和呷〻又亂髮灰水調一戔服更吹鼻中 一方病人頭髮灰吹鼻中 又人中白大蝦入射香少許研酒調服更吹鼻中　生地黄三五

斤擣汁連服以滓塞鼻中又蘿蔔取汁和酒飲之〇糯米炒黄為末二銭新水調服卽止〇棗肉以病人涎調付血不出邊又牛膝車前葉根汁和蜜服〇以井水濕紙帖頂心上如左鼻衄以線札左手中指右鼻衄札右手中指両鼻衄両指俱札卽止又以大白紙一張作十数摺浸水令濕置頂中以熨斗熨之至二三重紙乾立止勿令病人知以井華水忽然猛噀其面卽止 大口魚皮蘸水令濕塞鼻中亦止

治般暈

乗船大吐瀉頭旋眼花支體厥冷欲死急取枯白礬
末一錢百沸湯點服無則塩一匙醋一盞同煎服
或塩梅酸醎皆可煮服○暈者渴飲水即死飲童
溺最好自己尿亦好

治狐魅

着狐狸精恍惚走巡山野謂之狐魅取肝灸為末狐
水服一錢日三又取膓肚作羹臛食之又鷹肉食
之骨及爪燒灰末和水服又取狐狸皮鼻端黒處
為末酒調服並效

辟瘟疫

務成子螢火丸雄黃雌黃本草曰精明者為雌黃入門曰産山之陽者為雄産
山之陰者為雌亦如鷄冠明徹者佳各二兩螢火鬼箭羽蒺藜子白
礬燒各一兩羚羊角鍛竈灰鐵搥柄取入鐵處各二兩
半右為末以鷄子黃并雄鷄冠血一具和之如杏
仁大縫三角絳囊盛五丸帶左臂上又可掛於户
上辟疫惡氣百鬼虎狼蛇虺蜂蠆諸毒及白刃瘟
盗賊凶害昔劉子南得此方後與虜戰敗被圍矢
至子南馬數尺皆墮地虜以為神人解圍而去○
太乙流金散雄黃一兩半羚羊角雌黃礬石鬼箭
羽各七錢半右為麤末三角絳囊盛一兩帶心前

并掛戶上又青羮少許中庭炒之大壓瘟疫布
乞物虎頭元虎頭骨朱砂雄黃各一兩半蕪夷皂
莢鬼臼都似天南星下頭但南星體小鬼臼體大各一兩右為末熔
蠟和丸彈子大以紅絹帛盛一丸繫男左女右臂
上又懸屋四角如値近境疫作晦望夜半當戶燒
一丸晨起各人吞下小豆大一丸則不致傳染
老君神明散川烏炮四兩附子炮白朮各二兩桔
梗細辛各一兩右為麄末絳絹帛盛帶之一里人
皆無病　蘇合元香每取大丸浸一瓶清酒中時
時飲之最辟鬼疫之氣又縫囊盛三丸當心帶之

亦好　屠蘇飲白朮一兩八錢大黄川椒桔梗桂
心各一兩半虎杖根一兩二錢川烏六錢剉盛絳
囊十二月晦日中浸井元日早暁取出入二瓶清
酒中煎數沸東向飲一杯從少至老服之三朝以
其滓還沉井中一人飲之一家無疾一家飲之一
郷無疫○宣聖辟瘟丹臘月二十四平朝取井華
水盛浄器量人口多少浸乳香至歳朝五更湯令
温從少至老毎人一塊飲水一二呷嚥下則一
年不患時疫○側柏東向葉棟取乾正細末或湯
或酒調服○神聖辟瘟丹蒼朮二兩羌活獨活白

芷香附子大黄、月松三乃子赤箭雄黄各一两右
為末麵糊和丸彈子大黄丹為衣晒乾正乾朝厄
焚一炷○蒼朮燒之辟疫氣乾牛糞燒之亦佳○
除夜爆竹中庭則辟瘟○端五日以艾為人懸門
上○入瘟家以紙撚蘸香油并雄黄朱砂末探入
耳鼻内最能辟穢毒之氣○入疫家先令開啓門
户以大鍋盛水二斗置堂中心取蘇合元二十丸
煎之其香能散疫氣病者各飲一甌後醫者乃入
診視不相染○入疫家行動從容左位而入男子
病穢氣出於口女子病穢氣出於陰户其相對坐

立之間少須識其向背既出而以紙撚探鼻中嚏
嚏為佳○嚏法皂莢炙去皮作末每取少許吹入
鼻孔中令嚏半夏末亦佳如無此藥以紙撚探鼻
嚏之

治咳逆

傷寒及久病得咳逆皆為惡候取半夏五銭生干二
銭細剉水煎服即止　蘇合元三丸生干柿蒂煎
湯調服即止　皂角末吹鼻得嚏而止又作又嚏
丸百餘次遂止又硫黃二銭乳香一銭末酒煎急
令病人嗅其熱氣即止　刮取舂杵頭細糠吞之

即效

治痒噎

痒噎食不下刮取春杵頭細糠呑之即效

治痒失音

失音不能言杏仁桂心各一両末蜜丸櫻桃大綿裹含化嚥之又橘皮濃煎湯頻服苦竹葉濃煎飲之又荊芥蘇葉濃煎服之立效

治失欠脱頷

因呵欠牙車蹉跌口不能閉口(合)漿水不入以致不救取酒灌之令大醉睡中吹皂角末入鼻令嚏即自

上又鹽梅肉二箇擦开卽開又南星末干汁調付以帛縛合一宿自愈又法令一人抱定病人頭一人以手指擘其瞼以漸推之復入矣當疾出其指恐咬傷 黃蠟熨火作片乘熱貼付緩邊限差

治眼睛突出

眼睛無故突出一二寸以新汲水灌漬睛中數易水睛自入仍以麥門冬取桑白皮山梔子仁各一錢水煎服之 眼睛垂出至鼻如角黑色痛不可忍頃時時大便出血名肝脹羌活煎服愈 眼睛被撞打突出若眼系未斷卽推入胞內於四畔以生地黃

之自細擣厚付不令風侵若内有瘀血鍼刺出。愈

治覃唇

口唇緊小不能開合飲食不得不急治則死此亦奇

病名曰覃。急用薏苡仁湯薏苡仁防己赤小豆唇上

炒草甘炙各一錢半黄蕪用黄柏二兩以五倍子蜜

陁僧各二錢甘草二分為末水調塗黄柏上炙乾

再塗再炙藥盡為度後然將黄柏作薄片臨卧貼

覃唇上天明即愈又白布作燈炷如指大安斧刃

上燃炷令汗出拭取付唇上日二三度故青布亦

佳猪脂調付亦佳又用青皮燒灰猪脂調搽唇上

仍將青皮灰末每一錢酒調服之又蛇蛻皮或蹄
膊燒爲灰豬脂調傅

治唇腫

唇腫生鼠剖腹去腸腑和血付之雖毒腫無不即效
六月採乾笠耳浸水取汁以鵝卵翎頻塗即差

治腦背腫

凡癰疽發腦背至險必死宜用酒洗大黃及甘草每
三戔煎服　忍冬花與葉生搗燒酒調服又槐花
四兩炒入酒二椀煎服　麻油一斤煎十餘沸候
冷入好酒二椀和勻分五次一日夜盡服　薛蕩

葉爛搗研絞取汁和蜜飲之數次滓付上下付利
即愈○腫發背欲死鷄腸草擣付又伏龍肝末酒
調厚付頻易○背腫以廣黃色石如鵝卵者猛火
燒令赤醇醋中投入自有石屑落醋裡頻燒至石
盡取屑晒乾為末醋調塗之○腫毒所及處以狗
膽墨計和於蒜根汁圍塗之愈頻愈好待其毒暈
少挫漸次進塗以至腫頭之傍毒氣會腫頭成膿
破腫後付粘米飯最善吸膿榆根皮搗付亦好
腦後髮際腫取柏枝如指大者横研作馬蹄形抑
於慢火灰中乘熱點恰腫處以差為度　腦腫初

發時以無沙黃土和水造罐如煎膠陶罐而通其底安於腫處滿盛地龍又以土作盖而亂鑿衆孔置於地龍之上用艾大炷四五列於盖上而灸之候其地龍盡消更納更灸連日不輟則腫自消
灸法凡癰疽生於腦背初如粟米大或痛或痒因作赤色人皆慢忽不為治不過十日而死但於瘡上灸二三百壯無不愈但早覺早灸為佳始發一二日十灸十活三四日五六活五六日三四活七七日則不可灸惟頭為諸陽所聚艾炷宜小而少灸之　腫初發不知瘡頭以濕紙付其上先乾處

是也

一治疔腫

疔瘡初發突起如釘盖故謂之疔生黄疱中或紫黒色初發必先痒後痛先寒後熱四脂沉重頭痛心驚眼花若火重則嘔逆多因食自死牛馬禽獸肉而發殺人於一二日之内發在手足頭面胸背骨節間者最急其餘處為緩又有紅絲疔魚臍疔其毒尤甚○治法取蟾酥菉豆許置舌上仰卧取沫嚥下又鍼刺疔心納一丸於中紙貼護之神效又蜣螂取心下肉貼疔上半日易新者又斑猫一箇

捻破以付疔上封之又蒼耳莖葉燒灰醋塗之又白狗糞和水絞汁服滓付疔上又馬齒莧搗和顋垢封疔上並神效 疔初發時牛蒡子呑一粒其頭即出以真末作餅孔之用黄臘鎔點又白礬熔化少許入藍水浸之一晝夜即解一云礬入藍水煮一沸浸之限差又生大豆一握嚼和塗全也手足疥妙〇取桑枝如指大者横斫作馬蹄形挿於慢火灰中泉熱點熔疔處以差為度〇疔毒危重將死取土蛙窠一箇蛇蜕全者一條盛兜中黄泥固濟火煅存性為末每一錢空心好酒調服火頃腹中大痛〻止

而其疔已化為黃水矣又甘菊葉（一無甘字）搗取汁飲
一升又取莖葉搗付疔上卽愈并神效（一云冬用根無死亦
效）

紅絲疔悪鍼其絲出血取白芷汁滴孔中妙

魚臍疔取絲瓜葉連根蔥韭葉爛搗取汁和酒服山人
滓隨瘡左右貼腋下或脖下卽安又蛇蛻燒灰鷄
子調付瘡上

吸疔毒法取大蜘蛛一箇放瘡上自咂其毒連咼三
五箇其毒自敗如蜘蛛困則沉水中以活之為妙

又取蚯蚓八九條擂酒濾飲之滓貼四圍留頂出

毒氣○炙法大蒜搗爛塗疔四圍留疔頂以艾炙
百壯以爆爲效不爆難愈

手指忽腫痛不已地榆煮作湯漬之半日愈又黄泥
水調塗指周匝厚一寸許納熱灰中煨之令燥視
皮皺即愈○凡毒腫初發土蜂窠上細土醋和爲
泥付之柳葉若皮入鹽少許煮洗之○人鬚燒付
之又鹽湯温洗日三次如已成膿白丁香塗之立
潰

治癮疹

淸心元月經水調下極效又近火使身體温煖即消

寒薄者最得○樺皮水煎服之又益母草水煎服
之並有效○石灰和醋塗之○黒紅両色癧疹雞
子黄赤豆荊芥搗句塗付

痘瘡經驗方

謹避風寒切禁生冷終始宜守此戒○忌一切香臭
惡臭凡燒煮油炒烟臭滅燈燭臭燒髮毛羽去糞
穢通溝渠惡臭又忌房中淫慾梳頭巫覡僧尼外
人切勿出入要令内外安靜○禁忌食物生梨紅
柿西瓜大棗乾柿凢柿柑子橘柚一切酸醎寒冷
等物○凡痘熱盛故自不思魚肉而巫以爲僧神

皐家素飡甘者病見雖素魚肉至曰神故欲戲之
惶恐不敢與喫使血氣益虛而変而難出以至難
救痘家所宜深戒也

初熱三日初覺有痛勿論傷寒痘疹急用升麻葛根
湯葛根二錢白芍藥升麻甘草各一錢加入荊芥
穗鼠粘子炒山查肉各七分○小兒不肯服藥用
金銀花或忍冬茶以發汗為度而終不如湯藥也
○此時或發驚搐壁塞目竄切不把侍任其搐搦
意用半黃抱龍丸或抱龍丸甘草薄荷等分煎水
調下瀉青丸亦妙○此時或吐或瀉或吐瀉并作

自此至出痘終日症雖若劇皆不妨○此時若腰痛將少黒陷悪〻用神解湯柴胡一錢半乾葛防風各一錢麻黄升麻白伏令各八分甘草五分煎服後温覆出汗而不汗再服以痛止為度若無藥則只宜多汗而能食者免黒陷○此時或發渇切勿與冷水或金銀花茎或糯米煎水或三豆飲皆可飲又紅花子煎水亦妙

出痘三日始痛一日即發者極重二日發者亦重三日發者例也或游戯四五六七日乃出者勿藥之類也○此時吐瀉不足憂也○初見紅點悪用化

毒湯紫草茸升麻甘草各一戔加白芍藥一戔山
查肉七分蟬殼去頸足翅五分糯米百粒煎服限
三日〻再服則能令痘稀且無痘後諸症痘疫初
程之聖藥也○此時又急用乾臙脂調於白蜜頻
頻塗眼胞口唇鼻孔耳中以防痘出砂鉢臙脂和
朱砂用亦有少效○此時痘出太多毒盛急用連
翹升麻湯（即升麻葛根湯加連翹一戔者也）○此時急用鼠粘子
作末井水調付兒顖門以防眼患○此時或發驚
搐窒塞此則逆症也急用加減紅綿湯麻黃去節
全蝎去毒荊芥穗紫草茸蟬殼各五分葱白一莖

煎服〇此時腹痛者痘自腸胃出故也用蟬退湯
蟬殼十介甘草一戔半煎服或爲末白湯調下即
效〇此時或大渴求歠不已紅花子一合水煎服
或菉豆赤豆小豆各一合烏梅三箇水煎服黑湯
自正月經亦宜用〇取月經法糯米一握井水四
大挽煎至半候冷濃洗月經湯時連速用之蓋糯
米治痘毒養胃氣止泄瀉雖用十盆終無泄瀉之
憂〇此時或有四肢百節皆痛者此由痘未快出
或由未盡和解而然勿藥自愈〇此時可以觀形
色下虛實用藥〇出痘終日自初出第三日此時或有痒

症以木麥末糝於痒處以手揩摩即止若木麥末不效用敗草散勿論新草多年蓋屋受數歲日月霜露風雨極腐爛者也末糝之以手揩摩即效凡瘡或瓜破或潰爛流血流汁處皆可糝之○止痒莫如水楊取溪邊大葉赤枝之楊剉之大旱不斷之長流猛煮六七沸水乘其水極熱以細巾頻頻洗面部而又洗方有效淋故必以兩器遞易溫之日夜數十次多爲益好此藥能引出毒氣故頂陷者皆起如或黑陷處則綿絮量其大小廣狹而裁之漬此水乘熱遍付焦黑者皆濕爛毒不入裏如倒靨之類尤見奇效外治之

藥無過於此自此至落痂連日夜洗之但冬月浴
之恐觸風寒只洗面上可也春夏用葉秋冬用枝
（宜鹽日春冬用枝夏秋用菜水一盞入楊五斗）○此時必有咽痛連用猪
尾膏（末泔精小雄猪尾火以刺刀裂取血和龍腦作丸小至大過跳兩下或紫苹煎水下）如
聖散麥門冬吉更各一錢鼠粘子甘草各五分竹
葉三片如其毒盛用加味犀角消毒散鼠粘子炒
研二錢防風升麻各七分荊芥穗麥門冬吉更各
五分犀角五分臨服調下或煎服之亦得四貼日
再服
起脹三日（自出痘第四日）痘順者已自作如有脹意伏出者

先起以次漸起凡痘之虛實毒之淺深全在此間若痘密勢重急用神功散穀貼以救之黃芪人參白芍藥紫草生地黃牛蒡子紅花各等分前胡甘草減半若症險用神功散穀貼連用内托散黃芪蜜炙人參當歸川芎厚朴木炒防風桔梗白芷甘草各一錢木香官桂各三分若淡白灰黑陷伏更加丁香石糕○此時因癢委偃啼號不安者倒也○此時若煩渴用紅花子湯或烏梅湯方見上出痘條若咽痛不可忍口舌生瘡不能吮乳用加味犀角消毒飲方見上加芩連並炒連翹各七分極妙若不起

脹虛者用保元湯人參二錢黃芪甘草各一錢加
當歸白伏令白芍藥微炒各一錢肉桂五分生薑
一片糯米百粒●此時若泄瀉則大危急用保元
湯加白芍藥微炒白茯苓白木乾干炒黑肉桂各
七分犀角屑五分〇此時痘全白者由氣虛也用
保元湯加當歸白茯苓白芍藥酒炒各一錢官桂
七分生薑一片糯米百粒數貼以紅活爲度痘色
紅紫者用保元湯加木香當歸川芎各七分痘色
太紅近紫者由血虛也用四物湯生乾地黃酒炒
白芍藥炒當歸川芎各一錢加黃芩酒炒紫草紅

花各七分○此時若痛甚不可忍則白芍藥細末每一錢淡酒調下以黃土細末糝於痛處○此時發痒考上出痘終日條用藥○此時水楊湯日夜頻頻淋洗面部可也

貫膿三日自出痘至大七日凡痘順者第六日顆色白已有向膿之漸七日則面部浮氣益加此例症也八日浮氣稍藏亦能開眼咽痛 亦火俞○此時或吐或瀉或吐瀉大危也急用定中湯取眞正黃土一塊置碗內以百沸湯泡之以盞合候冷右用兩酒盞杞水飛朱砂末五分水飛雄黃末一錢火加砂糖

温服○此時宜以銀鍼刺之橫貫痘顆則汁自流
出極妙無銀鍼則竹鍼亦好○此時必發痒頻以
水楊湯熏之或有痒甚爪破者後必瘢痕以細巾
裹手指就其痒處按之甚緊則或有顆粒自破汁
出亦不妨○此時熱候必感連用月經間以猪尾
膏以降熱〻極者多用以膏中爽然爲度不然熱
自入內終至危境愼之愼之

收

收三日自出痘至九日十日而稍稍焦黑成痂時也此時必有大熱或
引飮異常須備糯米飮月經猪尾膏藥隨量痛飮
以膏中爽然爲度症輕者或不生熱然發熱者十

常八九矣○此時必有臂膊手足之痛盖面部既
已成靨故手足方欲脹膿浮氣益加之致元非別
症此則不必憂也○此時或有白睛上紅絲散漫
中有凸出之狀者痘出而然也仍爲翳目犯黑睛
而成白點氣血既復之後雖有勿藥之喜而豈可
倍其自愈而不急治乎惡實作細末和井華水作
餅貼付顖門上日再易妙○此時有泄瀉或赤白
痢者皆瀉熱而發也数日後自差不必用藥如氣
血俱虛熱乘其隙而發者日將加重終至難治急
用保元湯加白芍藥微炒白茯苓白朮土炒各一

錢肉豆蔻肉桂黃連酒炒乾干炒黑各七分連用
煅貼○此時手足臂脚所出之痘方始肥脹鍼刺
出汁可也法見胃膿條○此時有腹痛者用蟬退
湯上方見而此不效用木香理中湯木香人參白术
乾干炮甘草炙各五分加鼠粘子炒研黃連酒炒
各五分○此時胸膈之痛在中脘近處者餘毒歸
心然也急用乳香二錢水一盞煎服旦有脅痛者
曰瘀血而作韭菜取汁用之可也●此觸風寒時
而胸腹急痛者候似癨亂若以癨乱治之則必致
大危急用消風散荆芥穗甘草各一錢人參白茯

苓白殭蠶川芎防風藿香蟬退去頭足翅羌活各
五分陳皮厚朴製各三分加柴胡七分青皮各五
分入細茶一撮煎服三四貼即效◯此時有手足
戰掉或顫戰氣虛致然也宜用保元湯加當歸白
芍藥酒炒白茯苓各一錢肉桂七分◯此時瘡處
濕爛不斂治治上同而更加白朮土炒一錢以差
爲度◯此時有陰囊浮大年長者大如瓠瓜小兒
則大如鵝卵瘡毒與濕熱下注而然也亟用清毒
飲鼠粘子炒研三錢荊芥一錢防風甘草各五分
加黃芩酒炒生地黃洗知母草龍膽各五分數酒

貼甚效然此症勿藥自愈者多〇此時有吐瀉并
作者宜用定中湯上方見虛下嘔者亦效〇此時耽睡
哼之不應勸其乳食甚不肯喫病弛氣困而然也
宜用保元湯加白芍藥酒炒當歸身白茯苓鼠粘
子炒研各一錢肉桂七分干一片糯米百粒同煎
服之氣短耽睡者亦用石藥而難救者甚多〇此
時諸症難名若氣短虛若嘔泄若昏睡若不省氣
若奄奄盡敗症俱見者宜用四聖回天湯人参壹
黃芪當歸身各二錢石雄黃水飛末二錢臨服時
調下如或黑陷加白朮二錢以差為度極妙此藥

即全有享之所製也別無的指之症而形熱則極危誠用此藥頗有回生者蓋蔘芪補氣當歸補血雄黃寧脾胃治癀毒故也○此時譫語見鬼者熱也昏昏不省者亦熱也月經豬尾膏等藥連續用之可也若症危恐似不能救者則治法同黑陷○此時眼有赤白翳者可以急治而氣血未復之前輕用泄藥非徒無益於眼患或有関於死生必須完復之後方可藥治而又或自愈者有之○反眼之症必多於收靨之時而其為形也上瞼之毛必倒竪或直竪向前所見異常或上瞼之內有紅肉

痘毒下有此症者恍惚不省或狂言見鬼蓋形症古方之所不論而眼胞屬脾胃想必餘熱入脾胃故也自作方文名之曰連翹石膏湯連翹石膏研甘草煎水水飛各一錢半葛根生地黃山梔各七分升麻赤茯苓赤芍藥各五分甘草三分加黃芩酒炒黃連酒炒各七分急用之輕者二貼重者三四貼用輒神效十無一失○此後諸症或泄瀉嘔吐或眼患皆已畧論於上各以其藥治之可也

司準禦侮將軍行忠武衛副司果張之郁
禦侮將軍行忠武衛副司果張道行
宣畧將忠武軍衛副司勇高時後
宣畧將軍行忠武衛副司勇全壽朋
宣畧將軍行忠武衛副司勇趙光益仝校

攷事新書卷之十五終

